

Ficus colubrinae

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, V Mexiko

Roste v Mexiku, Guatemale, Belize, Hondurasu, Kostarice, Nikarague, Panamě a Kolumbii v podobě stromu anebo i jako epifyt. Dorůstá výšky 9 - 12 (i 15)m při průměru kmene až 45cm. Větve jsou v mládí hustě přitiskle dlouze ochlupené. Palisty jsou dlouhé 5 - 8mm a na vnější straně jsou dlouze zašpičatělé. Listy jsou oválné až podlouhlé, zaoblené nebo tupé, náhle 3úhle zašpičatělé, dlouhé 5 - 9cm, široké 2 - 5cm, báze zaoblená nebo tupá, 5tižilná, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, horní strana je holá, spodní kolem žilek přitiskle ochlupená a řapíky jsou přitiskle ochlupené a dlouhé 0,8 - 2,4cm. Lůžko je přisedlé, téměř kulovité, v průměru má 5 - 7mm, je holé, zelené nebo žluté, někdy červeně pruhované, zákrov malý, 2laločný laloky zaoblené a báze chlupatá.

<https://www.rostliny.net/>