

Ficus concinna

synonyma: *Ficus affinis*, *Ficus arayatensis*, *Ficus blumei*, *Ficus fecundissima*, *Ficus glabella*, *Ficus glabella* var. *affinis*, *Ficus glabella* var. *concinna*, *Ficus obovata*, *Ficus parvifolia*, *Ficus pseudoreligiosa*, *Ficus subpedunculata*, *Urostigma concinnum*, *Urostigma parvifolium*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Filipíny, J Čína, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Z Čína

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Indočíně, Filipínách, Sumatře, Andamanech a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 25)m při průměru kmene 25 - 40cm. Borka je tmavě šedá. Větve bývají na konci olistěné a vytvářejí vzdušné kořeny. Listy jsou úzce eliptické, dlouhé 5 - 10cm, široké (1,5 -) 2 - 4cm, zašpičatělé, báze klínovitá, okraj celokrajný, holý a řapíky dlouhé 1 - 2cm zakončené několik žlázkami. Plody jsou kulovité, seskupené po 2, 3 nebo 4ks, v průměru mají 4 - 5mm, vyrůstají na loňském dřevě a stopky jsou dlouhé 1 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *concinna*/*F. fecundissima*/*F. glabella* var. *affinis*/*F. glabella* var. *concinna*/*F. parvifolia*/*F. pseudoreligiosa*/*Urostigma concinnum* - listy holé; plody stopkaté

- var. *subsessilis*/*F. subpedunculata* - Čína, Indie, Thajsko; listy holé nebo řídce ochlupené; plody přisedlé nebo téměř přisedlé

<https://www.rostliny.net/>