

Ficus congesta

synonyma: *Covellia congesta*, *Ficus caulothyrsa*, *Ficus caulothyrsus*, *Ficus chalmersii*, *F. var. chalmersii*, *F. var. menadena*, *Ficus fasciculata*, *Ficus fasciculata var. subopposita*, *Ficus menadana*, *Ficus trichostyla*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Malajsie, Melanésie, Papua-Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Sulawesi (Celebes)

Roste na Moluckých ostrovech, Sulawesi, Bismarckově souostroví, Nové Guineji, Šalamounových ostrovech a Austrálii. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *congesta*/*F. fasciculata*/*F. setistyla*/*F. trichostyla* - Filipíny, Malajsie, Melanésie, Queensland; rozkladitý habitus; větve v mládí bývají ochlupené; palisty dlouhé 1 - 2cm; listy střídavé, široce eliptické až kosočtvercovité (i vejčité), špičaté, báze zaoblená až klínovitá, délka 12 - 25cm, šířka 8 - 13cm, žilnatina z 10ti párů žilek, řapíky dlouhé 1,5 - 4cm; plody hruškovité až diskovité, dlouhé i široké 2,5cm, stopky 1cm, 3 bazální listeny

<https://www.rostliny.net/>