

Ficus congesta

synonyma: Covellia congesta, Ficus caulothyrsa, Ficus caulothyrsus, Ficus chalmersii, F. var. chalmersii, F. var. menadena, Ficus fasciculata, Ficus fasciculata var. subopposita, Ficus menadana, Ficus trichostyla

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Malajsie, Melanésie, Papua-Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Sulawesi (Celebes)

Roste na Moluckých ostrovech, Sulawesi, Bismarckově souostroví, Nové Guineji, Šalamounových ostrovech a Austrálii. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. congesta/F. fasciculate/F. setistyla/F. trichostyla - Filipíny, Malajsie, Melanésie, Queensland; rozkladitý habitus; větve v mládí bývají ochlupené; palisty dlouhé 1 - 2cm; listy střídavé, široce eliptické až kosočtvercovité (i vejčité), špičaté, báze zaoblená až klínovitá, délka 12 - 25cm, šířka 8 - 13cm, žilnatina z 10ti páru žilek, řapíky dlouhé 1,5 - 4cm; plody hruškovité až diskovité, dlouhé i široké 2,5cm, stopky 1cm, 3 bazální listeny

<https://www.rostliny.net/>