

Ficus cumingii

synonyma: *Ficus ampelas* var. *linearis*, *Ficus angustissima*, *Ficus celtoides*, *Ficus chaii*, *F. var. angustissima*, *F. var. auriculifera*, *F. var. linearicaudata*, *F. var. terminalifolia*, *F. var. worcesteri*, *Ficus euphlebica*, *Ficus fallax*, *Ficus kusanoi*, *Ficus linearipseudopalma*, *Ficus multiramea*, *Ficus producta*, *Ficus somae*, *Ficus somai*, *Ficus terminalifolia*, *Ficus worcesteri*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Nová Guinea, Tchaj-wan

Roste na Filipínách, Tchaj-wanu, Indonésii a Nové Guineji v podobě stálezeleného keře nebo malého stromu. Větve jsou bílé, světle žlutě či hnědě ochlupené. Palisty jsou 3úhle kopinaté, dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou vstřícné až téměř vstřícné, eliptické až obkopinaté, zašpičatělé až hroťité, zubaté, dlouhé 8 - 19cm, široké 5 - 8cm, báze tupá až zkosená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky dlouhé 1,5 - 3cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, oranžovožluté až světlečervené, žlutě bíle tečkované, obvejčité až téměř kulovité s průměrem 1 - 1,5cm a stopky jsou krátké.

<https://www.rostliny.net/>