

Ficus curtipes

synonyma: Ficus obtusifolia, Urostigma obtusifolia, Urostigma obtusifolium

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Sumatra, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste v Bangladéši, Bhútánu, Číně, Malajsii, Myanmaru, Nepálu, Indii, Kambodži, Laosu, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu, v mládí jako epifyt. Dorůstá výšky 5 - 10m. Borka je světlešedá, hladká. Větve jsou v mládí zelené a holé. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou eliptické až obvejčité, dlouhé 10 - 16cm, široké 4 - 7cm, kožovité, celokrajné, na spodní straně světlezelené, horní strana tmavě zelená, báze klínovitá, konec tupý a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Plodí v paždí listů, plody jsou párovité, tmavě červené až růžově fialově červené, přisedlé, kulovité nebo zploštěle kulovité a v průměru mají 1 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>