

Ficus donnell-smithii

synonyma: Ficus florenciana

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Bolívie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Peru, S Brazílie, Střední Brazílie, Surinam, SZ Brazílie, Venezuela, Z Brazílie

Roste v Guatemale, Belize, Kostarice, Hondurasu, Francouzské Guyaně, Guyaně, Surinamu, Venezuele, Kolumbii, Bolívii, Ekvádoru a Peru v podobě nízkého stromu. Dorůstá výšky 4 - 5 (i 17)m při průměru kmene 20cm. Větve jsou krátce ochlupené, mírně olysávající. Palisty jsou dlouhé 5 - 7mm a jsou drobně ochlupené. Listy jsou podlouhlé až úzce obkopinaté, dlouhé 7 - 15cm, široké 2 - 2,7cm, zašpičatělé až zaoblené, báze zaoblená, horní strana draslavá nebo olysalá, spodní krátce ochlupená nebo holá, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,8cm. Plody jsou párovité, stopky dlouhé 6 - 7mm, zákrov široký 3 - 4mm, lůžko téměř kulovité s průměrem 8 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>