

Ficus gasparriniana

synonyma: *Ficus comata*, *Ficus cuneata* var. *congesta*, *Ficus cyanus*, *Ficus cyanus* var. *viridescens*, *F. var. viridescens*, *Ficus leekensis*, *Ficus silhetensis* var. *annamica*, *Ficus simplicissima* var. *annamica*, *Ficus stapfii*, *Ficus tournanensis*

čeleď: Moraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste v Bhútánu, Číně a Indočíně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou pružné, v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, obkopinaté nebo obvejčité, dlouhé 6 - 15cm, široké 2 - 5 (i 8)cm, zašpičatělé (i ocasovité), báze klínovitá nebo zaoblená, na konci s 1 - 4 páry zubů, horní strana drsná, řídce drobně hřebíkatá, spodní jemně ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 (i 1,5)cm. Plodí v párech v paždí listů, plody jsou vejčité, kulovité či eliptické, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,4cm, široké 0,6 - 1,2cm a stopky mají délku do 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *esquirolii*/*F. cehengensis*/*F. esquirolii* - listy kopinaté, na spodní straně řídce ochlupené, žilnatinu tvoří 8 - 18 párů žilek; plody kulovité až elipticky kulovité, velké min. 1cm
- var. *laceratifolia*/*F. bhotanica*/*F. laceratifolia* - Čína, Bhútán; listy obvejčité, tlustě papírovité až kožovité, spodní strana zelená, holá nebo řídce ochlupená, konec řídce zubatý
- var. *viridescens*/*F. congesta*/*F. cornata*/*F. cuneata* var. *congesta*/*F. cyanus* var. *viridescens*/*F. stapfii* - Čína, Indie, Laos, Thajsko, Vietnam; listy obvejčité, variabilní, na spodní straně hrubě ochlupené

<https://www.rostliny.net/>