

## Livistona saribus

synonyma: *Corypha saribus*, *Livistona cochinchinensis*, *Livistona hasseltii*, *Livistona hoogendorpii*, *Livistona inaequisecta*, *Livistona spectabilis*, *Livistona tonkinensis*, *Livistona vogamii*, *Sabal hoogendorpii*, *Saribus cochinchinensis*, *Saribus hasseltii*, *Saribus hoogendorpii*

čeleď: Arecaceae

oblasti: Indonésie, Kambodža, Laos, Luzon, Malajsie, Thajsko, Vietnam

Roste v jihovýchodní Asii v podobě palmy. Dorůstá výšky do 25 (i 40)m při průměru kmene 15 - 65cm. Listy vyrůstají na vrcholku v množství 25 - 30ks, řapík má délku 1 - 2m, šířku 12cm s velkými zahnutými ostny u mladých exemplářů, čepel je dlouhá 0,8 - 2m, široká 1,5 - 1,7m, zelená, spodní strana také zelená, rozdělená z 2/5 - 4/5 na 80 - 90 úkrojků. Květenství je dlouhé 0,6 - 2,3m, vlastní květy jsou žluté, korunní lístky 3úhlé až vejčité. Plody jsou kulaté, modré, dlouhé 1,1 - 2,5cm. Semeno je kulaté až eliptické, dlouhé 0,9 - 2,4cm a široké 0,9 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>