

Ficus lingua

synonyma: *Ficus buxifolia*, *Ficus micropison*

čeleď: Moraceae

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Malawi, Mosambik, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rovnicková Guinea, Středoafriická Republika, Tanzánie, Uganda

Roste v tropické a jižní Africe v podobě částečně epifytického stromu. Dorůstá výšky 6 - 12 (i 30)m. Borka je bělavá. Větve jsou v mládí štíhlé. Listy vyrůstají ve spirále až střídavě, jsou úzce obvejčité až obkopinaté, špičaté, dlouhé 0,5 - 5cm, široké 0,3 - 2 (i 3)cm (obvykle menší), matné, zelené, holé, zaoblené až protažené, celokrajné, báze je protažená žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Plody jsou párovité, stopkaté, umístěné v paždí listů nebo pod nimi, načervenalé až nažloutlé a v průměru mají 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *depauperata*/F. *buxifolia*/F. *depauperata* - bohatě větvený a rozkladitý strom, často epifyt; výška do 25m; borka hladká, šedá; listy obvejčité, tupé až zaoblené, báze klínovitá nebo tupá, délky 2 - 6cm, šířka 0,8 - 2cm, povrch holý, řapíky dlouhé 2 - 8mm; plodí v paždí listů nebo pod nimi, jsou žluté až červené, kulovité, široké 4 - 6mm, drobně ochlupené a mají 1 - 5mm stopku

<https://www.rostliny.net/>