

# Ficus maclellandii

synonyma: F. var. rhododendrifolia, Ficus rhododendrifolia, Ficus thorelii, Urostigma rhododendrifolium

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Sikkim, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Yunnan

Roste od Indie po Indočínu v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 - 20m. Borka je šedá a hladká. Větve jsou hustě hrbolkaté. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 0,4 - 1cm a na bázi mají chomáček bílých chloupků (na rozdíl od F. binnendijkii, kde nejsou). Listy jsou střídavé, podlouhlé až vejčitě eliptické, zašpičatělé až hroťité, kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 8 - 13cm, široké 4 - 6cm, báze zaoblená až klínovitá, žilnatinu tvoří 10 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 1,7cm. Plodí v párech v paždí listů, plody jsou růžovofialově červené, přisedlé, téměř kulovité až kuželovité a v průměru mají 0,6 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alii' - dlouhé úzké listy
- var. maclellandii - plody kuželovité
- var. rhododendrifolia/F. rhododendrifolia - listy úzké, holé, v mládí dlouze ochlupené; plody téměř kulovité

<https://www.rostliny.net/>