

Ficus pertusa

synonyma: *Ficus arbutifolia*, *Ficus arpazusa*, *Ficus baccata*, *Ficus cerasifolia*, *Ficus ciliolosa*, *Ficus complicata*, *Ficus consanguinea*, *Ficus daphniphylla*, *Ficus elliptica*, *Ficus erythrosticta*, *Ficus fadyeni*, *Ficus fasciculata*, *Ficus faydeni*, *Ficus garcesii*, *Ficus gardeniifolia*, *Ficus gemina*, *Ficus grabhamii*, *Ficus halliana*, *Ficus ibapohi*, *Ficus immersa*, *Ficus kanukuensis*, *Ficus lancifolia*, *Ficus morantensis*, *Ficus myrtifolia*, *Ficus ochroleuca*, *Ficus padifolia*, *Ficus palmicida*, *Ficus periplocaefolia*, *Ficus peruviana*, *Ficus planicostata*, *Ficus polypus*, *Ficus populnea* f. *planicostata*, *Ficus prinoides*, *Ficus prinoides* var. *subtriplinervia*, *Ficus radicans*, *Ficus rolandri*, *Ficus sapida*, *Ficus sonora*, *Ficus stricta*, *Ficus subtriplinervia*, *Ficus sulcipes*, *Ficus tapajozensis*, *Ficus tarapotina*, *Ficus trachelosyce*, *Ficus turbinata*, *Ficus zarzalensis*, *Pharmacosycea laurifolia*, *Pharmacosycea peruviana*, *Urostigma arbutifolium*, *Urostigma baccatum*, *Urostigma cestrifolium* var. *major*, *Urostigma complicatum*, *Urostigma erythrostictum*, *Urostigma geminum*, *Urostigma lancifolium*, *Urostigma padifolium*, *Urostigma pertusum*, *Urostigma populneum* f. *mexicanum*, *Urostigma rolandri*, *Urostigma sapidum*, *Urostigma schiedeianum*, *Urostigma subtriplinervium*, *Urostigma subtriplinervium* f. *ellipticum*, *Urostigma subtriplinervium* f. *major*, *Urostigma subtriplinervium* f. *majus*, *Urostigma sulcipes*, *Urostigma turbinatum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Surinam, Venezuela

Roste v Mexiku, střední Americe včetně Karibiku a v horní polovině Jižní Ameriky jako epifyt, později jako strom se vzdušnými kořeny a širokou korunou. Palisty jsou dlouhé 3 - 8mm. Listy jsou úzce podlouhlé až eliptické, špičaté, zelené, kožovité, někdy mírně zakřivené, dlouhé 5,5 - 8,5 (i 12)cm, široké 2,5 - 4 (i 4,7)cm, báze špičatá, centrální žebro je vyniklé, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Plody jsou párovité, stopkaté, obkruželovité až téměř kulovité, holé až drobně ochlupené, hnědé, dlouhé 8mm a široké 0,7 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>