

Ficus platyphylla

synonyma: Ficus kotschyana, Ficus lateralis, F. var. pubescens, Urostigma binderianum, Urostigma kotschyanum

čeleď: Moraceae

oblasti: Benin, Burkina Faso, Čad, Džibútí, Etiopie, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Kamerun, Mali, Niger, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Somálsko, Středoafričká Republika, Súdán, Togo, Uganda

Roste v tropické Africe v podobě epifytu, později stromu. Dorůstá výšky až 15 (i 25)m. Borka je světlehnědá a brázditá. Listy jsou mírně kožovité, eliptické až vejčité, špičaté až tupé, někdy na spodní straně ochlupené, dlouhé (8 -) 15 - 25 (i 26)cm, široké (5 -) 10 - 20cm, báze hluboce srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 10 (i 12)cm. Plody samostatné nebo v až 5tičetném svazku, holé nebo téměř holé, červené, o průměru do 2cm na 1 - 2,5cm stopce, bazální listeny jsou 2, vejčité, při bázi spojené.

<https://www.rostliny.net/>