

Ficus popenoei

synonyma: Ficus tolimensis

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Bolívie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru, S Brazílie, Střední Brazílie, Surinam, SV Brazílie, SZ Brazílie, V Brazílie, Venezuela, Z Brazílie

Roste od Mexika po Brazílii a Bolívii v podobě epifytu nebo stromu. Dorůstá výšky 6 - 20 (i 25)m při průměru kmene až 15cm. Větve jsou tlusté, hustě hnědorezavě ochlupené. Palisty jsou opadavé, přitiskle ochlupené dlouhé do 2cm. Listy jsou eliptické až obvejčité, široce zaoblené nebo tupé, hustě drobně drsně ochlupené až olysálé, dlouhé (3 -) 8 - 15 (i 21)cm, široké (1,5 -) 4 - 9,5 (i 12)cm, báze zúžená a srdčitá či zaoblená, spodní strana světlejší, hustě sametově ochlupená, žilnatinu tvoří (4 -) 7 - 10 (i 12) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Plody délky 1,4 - 2,2cm, šířky 0,9 - 1,6cm mají dlouze obvejčité lůžko délky 1,5 - 2cm, šířky 1cm, je ochlupené, stopky párovité, dlouhé 4mm, zákrov 2laločný a na vnější straně přitiskle ochlupený.

<https://www.rostliny.net/>