

Ficus pubigera

synonyma: *Ficus erecta* var. *khasiana*, *Ficus foveolata* var. *oleaeformis*, *Ficus howii*, *Ficus verrucosa*, *Pogonotrophe pubigera*, *Pogonotrophe verrucosa*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bhútán, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Yunnan, Z Himálaj

Roste v Číně, Indočíně, Indii a Nepálu v podobě šplhavého keře. Větve jsou holé, v mládí hustě tmavě hnědě ochlupené. Palisty jsou kopinaté, velké 4cm. Listy jsou podlouhlé nebo vejčité eliptické, dlouhé 7 - 35cm, široké 2,5 - 15cm, tenké kožovité, celokrajné, zašpičatělé, báze klínovitá až zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Plody jsou samostatné, kulovité, hruškovité nebo kuželovité, holé nebo ochlupené, široké 1 - 5cm, přisedlé nebo s až 3mm stopkou. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *anserine* - Yunnan, Laos; keř; listy úzce eliptické, dlouhé 30 - 35cm, široké 10 - 15cm, na spodní straně hustě hnědě plstnaté; plody hruškovité, dlouhé 4 - 6cm, široké 4 - 5cm a stopky dlouhé 0,3 - 1,5cm

- var. *maliformis*/F. *foveolata* var. *maliformis* - listy dlouze eliptické, dlouhé 8 - 12cm, široké 3 - 5cm, holé, na spodní straně hnědé; plody kulovité, holé a široké 1,5 - 2,5cm

- var. *pubigera*/F. *howii*/*Pogonotrophe pubigera* - listy podlouhlé, dlouhé 7 - 11cm, široké 2,5 - 4cm, tenké kožovité, na spodní straně v mládí ochlupené, horní strana holá, kolem žilek může být ochlupená; plody kulovité, ochlupené, přisedlé a široké 1 - 2cm

- var. *reticulata* - Yunnan; listy na spodní straně hustě hnědě červeně krátce ochlupené; plody červené, kuželovité, přisedlé a v průměru mají 1,3cm-

<https://www.rostliny.net/>