

Ficus sagittata (Smokvoň střelovitá)

synonyma: *Ficus adhaerens*, *Ficus bordeni*, *Ficus bordenii*, *Ficus carophylla*, *Ficus coccinella*, *Ficus compressicaulis*, *Ficus crininervia*, *Ficus lanaoensis*, *Ficus lanoensis*, *Ficus leptocarpa* var. *adhaerens*, *Ficus leptocarpa* var. *borneensis*, *Ficus leptocarpa* var. *crassa*, *Ficus leptocarpa* var. *oligosperma*, *Ficus leptocarpa* var. *subglabra*, *Ficus leptocarpa* var. *timorensis*, *Ficus oligosperma*, *Ficus radicans*, *Ficus ramentacea*, *Ficus ramosii*, *Ficus rigescens*, *Ficus rostrata*, *Ficus rubrocarpa*, *F. var. adhaerens*, *F. var. minor*, *F. var. oligosperma*, *Ficus subrigida*, *Ficus tayabensis*, *Pogonotrophe rigida*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Filipíny, Hainan, Jáva, JV Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Melanésie, Myanmar (Barma), Sikkim, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Tichý oceán, V Himálaj, Vietnam

Roste od Indie přes Čínu po Indočínu a Filipíny v podobě popínavého epifytu, později stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou vejčité kopinaté, opadavé a ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté až hroťité, kožovité, dlouhé 7 - 13 (i 20)cm, široké (3 -) 5 - 10 (i 14)cm, báze zaoblená až srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, oranžově červené, téměř kulovité, v průměru mají 0,5 - 1,5cm a stopky jsou krátké. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata'/*F. radicans* 'Variegata' - listy šedozelené, béžovobíle pestré

<https://www.rostliny.net/>