

Ficus sarmentosa

synonyma: *Ficus cabur*, *Ficus foveolata*, *Ficus foveolata* var. *foveolata*, *Ficus nepalensis*, *Ficus oblongifolia*, *Ficus ovata*, *Ficus reticulata*, *F. var. sarmentosa*, *Pogonotrophe foveolata*, *Pogonotrophe reticulata*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, J Čína, J Japonsko, JV Čína, Korea, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, S Indie, Sichuan, Sikkim, Tchaj-wan, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan, Z Himálaj

Roste od Nepálu po Koreu v podobě keře nebo dřevité liány. Větve jsou holé nebo bíle ochlupené. Palisty jsou vejčité kopinaté a dlouhé (0,6 -) 0,8 - 1cm. Listy jsou vejčité až kopinaté, špičaté, mírně kožovité, dlouhé (2,5 -) 6 - 10 (i 12)cm, široké (1,5 -) 2,5 - 4,5 (i 5)cm, báze zaoblená až široce klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,8 -) 1 - 1,2 (i 2)cm. Plody samostatné nebo párovité, červeně růžově fialové až červeně oranžové, kulovité až kuželovité, široké (0,5 -) 1 - 2cm a stopky mají délku 0,5 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *duclouxii*/F. *duclouxii* - Sichuan, Yunnan; poléhavý nebo šplhavý keř; větve v mládí hustě bíle ochlupené; listy elipticky vejčité, dlouhé 12 - 15cm, tupé nebo hrotité, v mládí bíle ochlupené, báze zaoblená až klínovitá, řapíky dlouhé 1 - 1,2cm; plody kulovité, holé, přisedlé, široké 1,5 - 2cm
- var. *henryi*/F. *arisanensis*/F. *foveolata* var. *arisanensis*/F. *foveolata* var. *henryi* - Tchaj-wan, Čína; poléhavé nebo šplhavé keře; větve hustě hnědě dlouze ochlupené; listy kožovité, vejčité eliptické, holé, zašpičaté, dlouhé 8 - 10cm, široké 3 - 4cm, na spodní straně hustě hnědě ochlupené a řapíky dlouhé 0,5 - 1cm; plody párovité, kuželovité, široké 1 - 1,5cm, v mládí hustě dlouze hnědě ochlupené, přisedlé až krátce stopkaté
- var. *impressa*/F. *baileyi*/F. *bodinieri*/F. *foveolata* var. *impressa*/F. *impressa*/F. *leucodermis* var. *saxicola*/F. *martini* - Čína; poléhavý nebo šplhavý keř; listy kožovité, kopinaté, zašpičaté, dlouhé 4 - 7cm, široké 1 - 2cm, na spodní straně bílé až šedohnědé a řapíky dlouhé 0,5 - 1cm; plody párovité, kulovité, v mládí ochlupené a široké 0,7 - 1cm
- var. *lacrymans*/F. *botryoides*/F. *kwangtungensis*/F. *lacrymans* - Čína, severní Vietnam; poléhavé nebo šplhavé keře; listy tenké, kožovité, kopinatě vejčité, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 2,5cm, zašpičaté až ocasovité, báze klínovitá a řapíky dlouhé 5mm; plody párovité, kulovité, holé nebo řídce ochlupené a široké 5 - 9mm
- var. *luducca*/var. *luducca* f. *sessilis*/F. *luducca*/F. *longepedata*/F. *sordida*/F. *trichopoda* - Čína; poléhavý habitus; větve téměř kulaté; listy úzce elipticky kopinaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 4 - 5cm, zašpičaté až ocasovité, báze klínovitá a řapíky dlouhé 2,5 - 3,5cm; plody kulovité, přisedlé nebo krátce stopkaté a široké 0,7 - 1,2cm
- var. *nipponica*/subsp. *nipponica*/F. *fortunate*/F. *foveolata* var. *nipponica*/F. *chaffanjonii*/F. *nipponica*/F. *oxyphylla*, *Ficus rufipes*/F. *seguinii* - Čína, Japonsko, Korea; šplhavý keř; větve světlehnědé; listy elipticky kopinaté, na spodní straně světležluté nebo šedožluté; plody kulovité, široké 1 - 1,2cm, stopky dlouhé do 5mm
- var. *sarmentosa*/F. *foveolata*/F. *reticulata* - Xizang, Bhútán, Nepál, Sikkim; popínavý nebo šplhavý keř; větve holé; listy 2řadé, téměř holé, vejčité až podlouhlé, mírně kožovité, dlouhé 8 - 12cm, široké 3 - 4cm, spodní strana zelenobílá až světležlutá a řapíky dlouhé 1cm; plody červenorůžovofialové, kulovité, holé, široké 1,5 - 2cm a stopky dlouhé 0,5 - 1,5cm
- var. *thunbergii*/F. *foveolata* var. *thunbergii*/F. *thunbergii* - Čína, Japonsko, Korea; šplhavý keř; listy elipticky vejčité, kožovité, dlouhé 4 - 7cm, na spodní straně dlouze ochlupené; plody samostatné (i párovité), elipticky kulovité, hustě hnědě ochlupené, široké 1,5 - 2cm a stopky dlouhé 1cm
- 'Variegata' - nerovnoměrně béžově lemované listy

<https://www.rostliny.net/>