

Ficus semicordata

synonyma: *Covellia conglomerata*, *Covellia cunia*, *Covellia inaequiloba*, *Ficus conglomerata*, *Ficus cuneata*, *Ficus cunia*, *Ficus hapalophylla*, *F. var. conglomerata*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ázád Kašmír, Bhútán, Indie, Indonésie, J Čína, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma)

Roste od Pakistánu přes Indočínu do Indonésie v podobě stromu s asymetrickou korunou. Dorůstá výšky až 10 (i 15)m při obvodu kmene do 2m. Borka je tmavěšedá a hladká. Větvě jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou červené, kopinaté, dlouhé 1,5 - 3 (i 3,5)cm. Listy jsou 2řadé, kopinaté až eliptické, zašpičatělé, mohou být jemně pilovité, dlouhé 10 - 30 (i 35)cm, široké (3,5 -) 5 - 10 (i 12)cm, báze zkoseně srdčitá, horní strana drsná, spodní ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,6 -) 1 - 1,5cm. Plody jsou bohaté, kulovité až hruškovité, růžové až hnědočervené, ochlupené, velké 1 - 1,7 (i 2)cm, přisedlé na větvích nebo i na kmeni a mají 5mm stopky.

<https://www.rostliny.net/>