

Ficus septica

synonyma: *Covellia leucantotoma*, *Covellia leucopleura*, *Covellia radiata*, *Covellia rapiformis*, *Covellia stictocarpa*, *Covellia venosa*, *Cystogyne leucosticta*, *Ficus brunnea*, *Ficus caesaria*, *Ficus casearia*, *Ficus didymophylla*, *Ficus eburnea*, *Ficus geminifolia*, *Ficus hauili*, *Ficus hauilii*, *Ficus kaukauensis*, *Ficus laccifera*, *Ficus laxiramea*, *Ficus leucantatoma*, *Ficus leucatomia*, *Ficus leucopleura*, *Ficus leucosticta*, *Ficus leucotoma*, *Ficus linearis*, *Ficus oldhamii*, *Ficus paludosa*, *Ficus philippense*, *Ficus philippensis*, *Ficus radiata*, *Ficus rapiformis*, *F. var. cauliflora*, *F. var. salicifolia*, *Ficus stictocarpa*, *Ficus venosa*, *Ficus verrucosa*

čeleď: Moraceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Melanésie, Queensland, Sumatra, Tichý oceán

Roste na Filipínách, Borneu, Sumatře a Austrálii v podobě keřovitého od báze větveného rozkladitého stromu. Listy jsou střídavé (i vstřícné), celokrajné, zvlňené, holé, lesklé, eliptické až vejčité, tupé, špičaté až ocasovité, dlouhé do 38cm, široké 23cm, báze zaoblená až široce srdčitá. Plody vyrůstají v paždí listů, jsou stopkaté, holé, hladké až žebrované, dlouhé 1,5cm, široké 2cm, zelené s bílými až rezavými skvrnami, později červenohnědé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cauliflora* - Šalamounovy ostrovy, Vanuatu, Queensland; plodí na kmeni i v paždí listů
- var. *septica* - Queensland; plody obvykle v paždí listů nebo i pod listy

<https://www.rostliny.net/>