

Ficus subincisa

synonyma: *Ficus caudata*, *Ficus chincha*, *Ficus clavata*, *F. var. paucidentata*, *F. var. trachycarpa*, *Ficus trachycarpa*, *Ficus trachycarpa var. paucidentata*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Ázád Kašmír, Bangladéš, Bhútán, J Čína, JV Čína, Kašmír, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Yunnan, Z Himálaj

Roste od Indie přes Čínu do Indočíny v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 6)m. Borka je tmavě šedá a hladká. Větve jsou červeně hnědé, tenké, úzce křídlaté. Palisty jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 0,8 - 1cm a opadavé. Listy jsou obvejčitě podlouhlé až elipticky kopinaté, mohou být zubaté, dlouhé (4 -) 7 - 15 (i 17)cm, široké (2 -) 3 - 5,5 (i 7)cm, papírovité, ocasovité, báze klínovitá, žilnatinu tvoří (4 -) 5 - 6 (i 7) párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,3 -) 0,5 - 0,8 (i 1)cm. Plody jsou samostatné, červenooranžové, eliptické až téměř kulovité, široké 0,6 - 2,5cm, mají 0,2 - 1cm stopky a vyrůstají v paždí listů. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *paucidentata*/*F. trachycarpa var. paucidentata* - keř; výška 1 - 2m; listy elipticky kopinaté, na okraji mírně zubaté; plody kulovité, hladké, široké 0,6 - 1,2cm
- var. *subincisa*/*F. clavata* - keř; výška 1 - 3m; listy obvejčitě podlouhlé; plody široké 1,2 - 2,5cm

<https://www.rostliny.net/>