

Ficus subulata

synonyma: *Ficus acuminata*, *Ficus ancolana*, *Ficus boiei*, *Ficus confusa*, *Ficus dicarpa*, *Ficus driveri*, *Ficus erythropareia*, *Ficus iteoides*, *Ficus klinkii*, *Ficus salicifolia*, *Ficus sanhday*, *Ficus saxatilis*, *Ficus sikkimensis*, *F. f. driveri*, *F. f. inaequifolia*, *F. f. minima*, *F. f. ovoidea*, *F. f. sessilis*, *F. var. ancolana*, *F. var. boiei*, *F. var. borneensis*, *F. var. diveri*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Borneo, Filipíny, Hainan, Jáva, JV Čína, JZ Čína, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Melanésie, Myanmar (Barma), Nepál, Papua-Nová Guinea, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Tichý oceán, V Himálaj, Vietnam, Z Čína

Roste od východního Himálaje po Malajsii a Šalamounovy ostrovy v podobě šplhavého dvoudomého keře. Větve jsou hnědozelené. Palisty šídlovité, dlouhé (0,6 -) 1,5 - 2cm. Listy jsou zkoseně eliptické až obkopynaté, celokrajné, papírovité, dlouhé 8 - 15cm, široké 2,5 - 7cm, špičaté, v mládí drobně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,4cm. Plody párovité nebo svazčité, oranžově červené, kulovité až vejčité, velké 0,2 - 1,2cm a stopky jsou dlouhé 2mm.

<https://www.rostliny.net/>