

Ficus trichocarpa

synonyma: *Ficus ahernii*, *Ficus aspera* var. *volubilis*, *Ficus filiformis*, *Ficus nodulosa*, *Ficus obtusa*, *Ficus obtusa* var. *gedehensis*, *Ficus obtusa* var. *genuina*, *Ficus obtusa* var. *piperifolia*, *Ficus phaeopoda*, *Ficus piperifolia*, *Ficus piperifolia* var. *borneensis*, *Ficus platycaula*, *Ficus pyrrhopoda*, *Ficus tawaensis*, *F. var. borneensis*, *F. var. obtusa*, *F. var. piperifolia*, *F. var. trichocarpa*, *Pogonotrophe bornensis*, *Pogonotrophe javana*, *Pogonotrophe phaeopoda*, *Pogonotrophe piperifolia*, *Pogonotrophe pyrrhopoda*, *Urostigma trichocarpum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Tchaj-wan

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *obtusa*/F. *obtuse* - Tchaj-wan, Indonésie, Filipíny; šplhavý keř se vzdušnými kořeny; větve v mládí hnědě huňaté; palisty hnědě ochlupené; listy široce vejčité až široce podlouhlé, dlouhé 8 - 11,5cm, široké 5,4 - 10,8cm, holé, tupé až zaoblené, okraj mírně žláznatě zubatý, v mládí hnědě huňaté, báze tupá až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 2,2cm; plody samostatné nebo seskupené, kulovité až obkuželovité, dlouhé 1 - 1,8cm, široké 1,6 - 1,9cm a stopky dlouhé 7 - 8mm

<https://www.rostliny.net/>