

Ficus trivía

synonyma: *Ficus stapfii*, *F. var. tenuipetiola*, *F. var. trivía*

čeleď: Moraceae

oblasti: Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 8m. Borka je šedá. Větve jsou v mládí červenohnědé, široké 3 - 5mm. Palisty jsou vejčitě kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,5cm. Listy jsou obvejčité až eliptické, papírovité, celokrajné, špičaté, dlouhé 6 - 16cm, široké 2,5 - 8cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 5cm. Plody samostatné nebo párovité, téměř kulovité, holé, široké 1 - 2cm a stopky dlouhé 0,3 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *laevigata* - listy eliptické, holé nebo řídce ochlupené, dlouhé 6,5 - 16cm, široké 2,5 - 4cm, báze úzce klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 9cm; plody početné, široké 1cm a mají 0,5 - 1cm stopky

- var. *trivía*/var. *tenuipetiolata*/*F. cuneata* var. *congesta* - listy vejčitě eliptické až obvejčité, papírovité, holé, dlouhé 6 - 16cm, široké 4 - 8cm, spodní strana holá, ochlupené mohou být pouze žilky, báze zaoblená až široce klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm; plody samostatné nebo párovité, široké 1 - 2cm a mají 3 - 8mm stopky

<https://www.rostliny.net/>