

Ficus vallis-choudae

synonyma: Ficus schweinfurthii

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Eritrea, Etiopie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, Malawi, Mali, Mosambik, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Středoafriická Republika, Súdán, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 10 (i 20)m. Borka je šedě hnědá. Větve jsou v mládí široké 0,2 - 1cm. Listy jsou široce vejčité, tupé nebo špičaté, zvlněné, zubaté až celokrajné, mohou být ochlupené, dlouhé (4 -) 10 - 26 (i 36)cm, široké (3 -) 6 - 24 (i 30)cm, báze srdčitá nebo zaoblená a řapíky jsou dlouhé 2 - 11 (i 13,5)cm. Plodí v paždí listů nebo pod nimi, plody jsou žluté nebo načervenalé, kulovité až obvejčité, široké 2 - 4,5cm, holé nebo ochlupené až plstnaté a mají 3 - 7mm stopky.

<https://www.rostliny.net/>