

Dracaena mannii

synonyma: *Dracaena nitens*, *Dracaena perrottetii*, *Dracaena perrottetii* var. *minor*, *Dracaena pseudoreflexa*, *Dracaena reflexa* var. *nitens*, *Dracaena tessmannii*, *Dracaena thomsoniana*, *Dracaena usambarensis*, *Draco mannii*, *Draco perrottetii*, *Pleomele heudelotii*, *Pleomele mannii*, *Pleomele nitens*, *Pleomele perrottetii*, *Pleomele usambarensis*

čeleď: Dracaenaceae

oblasti: Angola, Benin, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie, Republika Kongo, Rovníková Guinea, Středoafriická Republika

Roste v tropické Africe v podobě bohatě větveného stromu. Dorůstá výšky 3 - 5 (i 12)m. Borka je bělavá a hladká. Listy se objevují na koncích větví, jsou úzké, dlouhé 16 - 40cm, široké 1 - 2cm, tmavězelené a lesklé. Květenstvím je volný klas nebo lata o délce až 50cm, vlastní květy jsou béžové. Plody jsou červené, dužnaté a v průměru mají 2 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>