

## Acacia farnesiana (Akácie Farnesova)

synonyma: *Acacia acicularis*, *Acacia densiflora*, *Acacia edulis*, *A. f. pedunculata*, *A. subsp. minuta*, *A. var. lenticellata*, *Acacia ferox*, *Acacia indica*, *Acacia lenticellata*, *Acacia minuta*, *Acacia minuta subsp. densiflora*, *Acacia minuta subsp. minuta*, *Acacia pedunculata*, *Acacia smallii*, *Farnesia odora*, *Farnesiana odora*, *Mimosa acicularis*, *Mimosa farnesiana*, *Mimosa indica*, *Mimosa pedunculata*, *Mimosa suaveolens*, *Pithecellobium acuminatum*, *Pithecellobium minutum*, *Popanax farnesiana*, *Poponax farnesiana*, *Vachellia densiflora*, *Vachellia farnesiana*, *Vachellia farnesiana var. minuta*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Dominikánská Republika, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Austrálie, Katalánsko, Libanon, Louisiana, Makaronésie, Mississippi, Nové Mexiko, Nový Jižní Wales, Pákistán, Portoriko, Queensland, Severní teritorium, Sicílie, Sýrie, Texas, Západní Austrálie

Roste v tropické Americe v podobě hustého trnitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 4,5 (i 9)m. Borka je tenká, hnědá a šupinatá. Větve vyrůstají cik-cak, mají trny délky 1 - 2,5 (i 5)cm. Listy jsou zelené, dlouhé 5cm, mají 1 - 1,3cm řapíky, zpeřené, 1 - 8 primárních dílů, 5 - 25 sekundárních, vlastní lístky jsou čárkovité, tupé až prakticky špičaté, dlouhé 0,2 - 1,5cm, široké 0,8 - 3,5mm a báze zakulacená či uťatá. Květenství je kulovité, vyrůstá po 2 - 3 (i 6)ti ks, má 1 - 3cm stopku, šířku 1 - 1,5cm, vlastní květy jsou žluté, kalich dlouhý 2mm a koruna je dlouhá 2,5 - 3mm, 5tilaločná. Plodem je válcovitý tmavěhnědý lusk délky (1,5-) 4 - 8 (i 9)cm, šířky (0,8-) 1 - 1,6 (i 2)cm a obsahuje 10 - 16 eliptických semen délky 6 - 8mm a šířky 4 - 5,5mm.

<https://www.rostliny.net/>