

Acacia auriculiformis

synonyma: *Acacia auriculaeformis*, *Acacia moniliformis*, *Racosperma auriculiforme*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Florida, Nová Guinea, Pákistán, Queensland, Severní teritorium

Pochází z Nové Guineje a severní Austrálie. Dorůstá výšky 9 - 25 (i 35)m při průměru do 50cm s bohatým větvením a široce rozložitou korunou. Borka je šedá až černá. Větve jsou na koncích zploštělé. Fylodia jsou čárkovitá, srpovitá, špičatá, šedozelená, dlouhá (8 -) 10 - 15 (i 22,5)cm a široká 1 - 5,2cm. Listy jsou úzké, protáhlé s výraznými podélnými žilkami, délka dosahuje až 16cm a šířka 3cm. Květenstvím je klas délky 5 - 8 (i 10)cm na 5 - 8mm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, žluté, kalich dlouhý 0,7 - 1,3mm, laloky 3úhlé, dlouhé 0,2mm a koruna je dlouhá 1,7 - 2,4mm. Plodem je plochý kožovitý až dřevnatý stočený lusk délky 3,2 - 16cm 7cm a šířky 0,8 - 1,8cm obsahující eliptická tmavěhnědá až černá semena délky 3,6 - 5,6mm.

Rychle roste, ale je krátkověká.

<https://www.rostliny.net/>