

## Acacia concinna (Akácie vzhledná)

synonyma: *A. var. rugata*, *Acacia hooperiana*, *Acacia hooperiana var. glabriuscula*, *Acacia hooperiana var. subcuneata*, *Acacia philippinarium*, *Acacia poilanei*, *Acacia polycephala*, *Acacia quisumbingii*, *Acacia rugata*, *Guilandina microphylla*, *Mimosa concinna*, *Mimosa rugata*, *Nygae sylvarum-minimae*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Malajsie, Nepál, Thajsko, Vietnam

Roste v tropické Asii v podobě rozkladité vícekmenného liány. Dorůstá délky 7 - 30m při průměru kmínku až 10cm. Na povrchu má 5 řad až 3mm dlouhý šedých ostnů. Větve jsou na koncích plstnaté. Palisty jsou srdčité, mírně ocasovité, ochlupené, opadavé, dlouhé 3 - 8mm a široké 1,5 - 6mm. Listy jsou 2x sudozpeřené, dlouhé 6 - 22cm, ostnitě, řapíky dlouhé 1,2 - 6cm, zpeřené, mají 10 - 37 primárních párů, 4- 11 sekundárních, vlastní lístky jsou jemně ochlupené, dlouhé 0,4 - 1,3cm, široké 0,8 - 4,8mm, zakulacené, asymetrické, ostré až prakticky hákovité. Květenství je hroznovité až latnaté, dlouhé do 20cm, tvořené hlávkami nebo klubkami o průměru 0,7 - 1,2cm, vlastní květy jsou přisedlé, oboupohlavné, 5tičetné, bílé až béžové či nažloutlé, kalich červený, dlouhý 2 - 3,2mm, koruna dlouhá 2,3 - 4mm. Plodem je hnědý až černý zaškrcovaný lusk délky 4,5 - 15cm, šířky 1,5 - 2cm a obsahuje eliptická až kulatá semena délky 0,7 - 1,1cm a šířky 4,5 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>