

# Acacia retinodes (Kapinice pryskyřičnatá)

synonyma: *Acacia provincialis*, *Acacia retinoide*, *Acacia retinoides*, *Acacia rhetinoides*, *Acacia rostelifera*, *Acacia semperflorens*, *Racosperma retinodes*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Andalusie, Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 10m. Větve bývají v mládí občas převislé, zpravidla hranaté až zploštělé. Fylodia bývají obkopynatá, tenká, zelená až namodralá, dlouhá 3 - 22cm a široká 0,3 - 1,5cm. Květenstvím je hrozen, hlávky jsou kulovité, 18 - 50tičetné, mají 2 - 7mm stopku, vlastní květy jsou žluté (i béžové), 5tičetné a kališní lístky jsou srostlé, kalich je zvonkovitý, dlouhý 0,5 - 0,7mm a koruna je dlouhá 1,2 - 1,5mm. Plodem je čárkovitý lusk délky 12 - 16cm, šířky 7mm a obsahuje eliptická hnědá až černá semena délky 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *retinodes* - Viktoria, Jižní Austrálie; výška 6 - 8m; větve zpravidla převislé; fylodia obkopynatá (i čárkovitá), šedo-zelená až namodralá, špičatá, dlouhá 7 - 22cm, široká 0,3 - 1,5cm; hlávky 30 - 50tičetné, vlastní květy žluté

- var. *uncifolia* - Viktoria, Jižní Austrálie, Tasmánie; výška 5 - 10m; větve zpravidla rozkladité; fylodia obkopynatá, zelená, dlouhá 3 - 6,5cm, široká 0,3 - 1cm; hlávky 18 - 30tičetné, světležluté až béžové

<https://www.rostliny.net/>