

Acacia senegal (Kapinice senegalská)

synonyma: *Acacia circummarginata*, *Acacia cufodontii*, *Acacia oxyosprion*, *Acacia rupestris*, *A. subsp. modesta*, *A. subsp. senegalensis*, *Acacia spinosa*, *Acacia volkii*, *Mimosa senegal*, *Senegalia senegal*

čeleď: Fabaceae

oblasti: J Afrika, Mauretánie, Omán, Pákistán, Paňdžáb (indický), Rádžastán, Senegal, Somálsko

Roste od Senegalu a Mauretánie po Somálsko v podobě keře nebo stromu se zploštělou korunou. Dorůstá výšky (1,2 -) 3 - 6 (i 15)m při průměru kmene do 30cm. Borka je žlutohnědá, červenohnědá nebo šedohnědá. Na povrchu pod kolénky vyrůstají nejčastěji po 3ks trny o délce 3 - 7mm. Listy jsou střídavé, 2x sudozpeřené, tvoří je (1 -) 3 - 8 primárních párů, 4 - 25 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 1 - 7mm a široké 0,5 - 1,8mm. Květenstvím je klas délky 2 - 12cm, vlastní květy jsou bílé až béžové, mají kalich délky 2 - 3mm a koruna je dlouhá 2,7 - 4mm. Plody jsou šedohnědé, zaškrcované, červenohnědé nebo tmavěhnědé, ochlupené, dlouhé 3 - 15cm a široké 1,2 - 3,3cm široké a obsahují 5 - 6 semen délky 6 - 9mm a šířky 5 - 8mm. Stromy produkují nejvíce arabské gumy v rozmezí stáří 8 - 40ti let. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *leiorachis* - jižní Afrika; štíhlý strom; výška do 8m; borka se odlupuje v papírových pruzích, na povrchu vyrůstají hákovité trny po 3ks; listy vyrůstají v 1 - 4četných přeslenech, tvoří je 3 - 5 primárních párů, 7 - 15 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 4 - 7mm a široké 1,4 - 1,7mm; květenstvím je klas délky 3 - 8cm, vlastní květy jsou žlutobílé; lusky jsou zploštělé, šedohnědé až bleděhnědé, pukavé, dlouhé do 9cm, široké 2cm

- var. *rostrata* - jižní Afrika; opadavý strom nebo keř; výška 2 - 5m; borka šedožlutá, korkovitá; větve žluté s trny o délce do 8mm; listy mají 3 - 8 primárních párů, 10 - 22 sekundárních párů, lístky světlezelené, dlouhé 1 - 5mm; klasy samostatné nebo párovité, dlouhé 6 - 8cm, široké 1cm, vlastní květy světlebéžové; lusky vyrůstají po 1 - 4ks, dlouhé 4 - 7cm, široké 2 - 3cm, drobně ochlupené, v mládí šedozelené až světlehnědé

Množí se zejména semeny.

<https://www.rostliny.net/>