

Acacia tenuifolia (Akácie latnatá)

synonyma: *Acacia clausenii*, *Acacia grandisiliqua*, *Acacia martinicensis*, *Acacia microcephala*, *Acacia paniculata*, *Manganaroa paniculata*, *Mimosa grandisiliqua*, *Mimosa paniculata*, *Mimosa tenuifolia*, *Senegalia paniculata*, *Senegalia tenuifolia*, *Senegalia tomentella*, *Senegalia turbacensis*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Bolívie, Brazílie, Indie, Kostarika, Kuba, Peru, Venezuela

Roste v Peru, Bolívii, Brazílii, Venezuele, Karibiku, Kostarice a Indii v podobě šplhavé popínavky. Dorůstá délky až 8m při průměru kmene 10 - 15cm. Na povrchu se objevují trny, které mohou být zahnuté. Listy mají řapíky délky 10 - 15cm, čepel je zpeřená, tvoří je 10 - 32 primárních párů, 20 - 60 sekundárních párů, vlastní lístky jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 2 - 3mm. Květenství má 1cm dlouhou stopku, vlastní květy mají kalich délky 1,5mm a koruna je dlouhá do 2mm. Plodem je kožovitý zprvu drobně ochlupený lusk délky 7 - 11 (i 25)cm a šířky 2 - 3 (i 3,5)cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *producta*

<https://www.rostliny.net/>