

Acacia drummondii

synonyma: *Acacia drummondii*, *A. var. typica*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 2m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy mají řapíky délky 0,5 - 5mm, jsou zpeřené, mají 1 - 4 primární páry délky 0,2 - 1cm, sekundární jsou dlouhé 0,4 - 2cm, vlastní lístky jsou mírně obvejčité, zelené či namodralé, dlouhé 0,3 - 1,2cm a široké 1 - 6mm. Květenstvím je klas délky 1 - 4cm na 1 - 3cm stopce, vlastní květy jsou světležluté až žluté a 5tičetné. Plodem je lusk délky 1,5 - 5cm, šířky 3,5 - 8mm a obsahuje eliptická semena délky 2 - 3,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *affinis/A. varia var. affinis* - výška 0,3 - 1m; listy mají 2 primární páry délky 0,5 - 1cm, 2 - 6 párů sekundárních délky 0,5 - 1,5cm, vlastní lístky zelené, ochlupené, dlouhé 0,3 - 1cm a široké 1 - 2mm; lusky ochlupené
- subsp. *candolleana/var. candolleana/var. major/A. candolleana* - výška 0,3 - 2m; větve zpravidla jemně ochlupené; listy mají 1 primární pár délky 0,4 - 1cm, 2 - 4 sekundární páry, vlastní lístky mírně obvejčité, zelené či namodralé, dlouhé 0,5 - 1,2cm a široké 3 - 6mm; lusky zpravidla ochlupené
- subsp. *drummondii* - habitus může být rozprostřený; výška 20 - 60cm; větve jsou v mládí zpravidla jemně ochlupené; listy mají zpravidla 2 primární páry délky do 1cm, 2 - 3 sekundární páry, vlastní lístky jsou dlouhé 3 - 6mm a široké 1 - 2mm; lusky jsou řídce ochlupené
- subsp. *elegans/A. pseudodrummondii/A. pelloiae* - výška 1 - 2m; větve v mládí zpravidla drobně ochlupené; listy mají 2 primární páry délky 0,5 - 2cm, 2 - 4 sekundární páry, vlastní lístky mírně obvejčité, zelené, dlouhé 0,5 - 1,2cm a široké 2 - 4mm; korunní lístky jsou zpravidla ochlupené; lusky drobně ochlupené

<https://www.rostliny.net/>