

Acacia sieberiana

synonyma: *Acacia amboensis*, *Acacia purpurascens*, *A. subsp. vermoesenii*, *Acacia vermoesenii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: JV Afrika, Pákistán

Roste v Africe v podobě stromu s deštníkovitou korunou. Dorůstá výšky 3 - 17m. Borka je bleděhnědá, šedožlutá nebo šedá (i žlutá), odlupuje se a je mírně korkovitá. Palisty jsou přetvořené v párovité přímé trny o délce 0,6 - 12cm. Listy jsou zpeřené, tvoří je (3 -) 6 - 23 (i 35) primárních párů, 14 - 52 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 7mm a široké 0,5 - 1,5mm. Květenstvím je hlávka a vlastní květy jsou bílé nebo světležluté. Plodem je lesklý hnědý tlustý lusk, může být mírně zahnutý, dlouhý (8 -) 9 - 21cm a široký (1,5 -) 1,7 - 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *sieberiana* - větve jsou v mládí prakticky holé
- var. *woodii*/var. *vermoesenii*/*A. vermoesenii*/*A. woodii*/'*Woodii*' - jihovýchodní Afrika; výška 9m, šířka 15m; koruna je rozložitá, plochá až deštníkovitá; větve jsou v mládí ochlupené; borka žlutohnědá; listy 2x zpeřené, dlouhé 10cm, vlastní lístky drobné, žlutě ochlupené; květy světle béžovobílé; dobře snáší sucho

<https://www.rostliny.net/>