

Acacia collinsii

synonyma: *Acacia costaricensis*, *Acacia glutea*, *Acacia nelsonii*, *Acacia panamensis*, *Acacia penonomensis*, *Acacia yucatanensis*, *Myrmecodendron collinsii*, *Myrmecodendron costaricense*, *Tauroceras spadicigerum*, *Vachellia collinsii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Belize, Guatemala, J Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Panama

Roste od Mexika po Kolumbii v podobě zpravidla vícekmenného poloopadavého stromu. Dorůstá výšky do 5 (i 10)m. Borka je šedá. Trny jsou na bázích větví párovité (u báze spojené do V), dlouhé 3 - 5cm, široké 0,5cm, v jejich dutinách se usazují mravenci a jedná se o přeměněné palisty. Listy jsou střídavé, 2x sudozpeřené, dlouhé i široké 15cm, v prvním řádu je 4 - 12 (i více) párů, v druhém 12 - 20 (i 24) párů, vlastní lístky jsou dlouhé 6 - 8mm, široké 2mm. Květenství jsou klasovitá, válcovitá, dlouhá 3cm, široká 3mm, krátce stopkatá, vlastní květy jsou drobné a žluté. Plodem je špičatý nebo tupý tmavěhnědý lusk délky 2,5cm a široký 1cm.

Vyhovuje ji plné slunce, teplo s výskytem období sucha.

<https://www.rostliny.net/>