

Thymelaea passerina (Vrabečnice roční)

synonyma: *Daphne passerina*, *Ligia passerina*, *Lygia passerina*, *Passerina annua*, *Passerina arvensis*, *Passerina diarthronoides*, *Passerina passerina*, *Stellera annua*, *Stellera passerina*, *Thymelaea arvensis*

čeleď: Thymelaeaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Česká republika, Illinois, Iowa, Írán, Itálie, Kansas, Katalánsko, Mississippi, Nebraska, Německo, Ohio, Ontario, Polsko, S Afrika, Švýcarsko, Texas, Washington, Wisconsin, Z Asie

Roste ve střední a jižní Evropě, severní Africe a v západní Asii. Zavlečen byl do Severní Ameriky. Patří mezi byliny, ale báze bývá dřevnatá. Dorůstá výšky 15 - 40 (i 70)cm. Lodyhy je vzpřímená, nevětvená nebo chudě větvená. Střídavé listy jsou přisedlé a mají úzce kopinatý tvar délky (0,3 -) 0,7 - 1,5 (i 2,1)cm, šířky 0,7 - 2,5 (i 4)mm a občas mohou být žláznatě tečkované. Kvete oboupohlavnými květy délky 2 - 3mm s kališními lístky délky 0,5 - 0,8mm v paždí listů s 2mi listenci v po jednom nebo ve skupině 1 - 5ti ks. Plodem je hnědozelená hruškovitě tvarovaná nažka délky 2 - 3mm obsahující bílá semena. Patří mezi chráněné druhy C2.

Roste na okrajích polí, rumišťích, úhorech, atp. na plném slunci s ideálně vápenitým podkladem.

<https://www.rostliny.net/>