

Acacia gerrardii

synonyma: *Acacia hebecladoides*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Benin, Irák, Izrael, Jihoafrická Republika (JAR), Súdán

Roste od jihozápadní Asie přes celou Afriku v podobě poloopadavého stromu s deštníkovitou korunou nebo řídkého keře. Dorůstá výšky 3 - 15m při průměru kmene 20 - 30cm. Borka je šedá až černá, drsná, brázditá a odlupuje se. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou přeměněné ve zpravidla přímé (mohou být zahnuté či hákovité) trny délky 1 - 6cm. Listy jsou 2x sudozpeřené, primární větveno dlouhé (1,5 -) 2 - 7cm, má (3 -) 5 - 10 (i 12) párů lístků, sekundární větveno má (8 -) 12 - 23 (i 28) lístků, vlastní lístky jsou eliptické, dlouhé 3 - 7,5mm a široké 1 - 2mm. Květenstvím je kulovitý strboul na žláznaté stopce, vlastní květy jsou bílé nebo béžové. Plodem je pukavý mírně srpovitý lusk úzký lusk délky (4,5 -) 7 - 16 (i 22)cm a šířky 0,6 - 1,1cm. Semena jsou asymetricky čtvercová, zploštělá, hnědošedozelená, hladká a dlouhá 0,9 - 1,2cm.

Vyhovují ji travnaté či stromové savany v hlinitých či jílovitých zpravidla vápenitých půdách.

<https://www.rostliny.net/>