

# Acacia irrorata

synonyma: *Racosperma irroratum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Borka je hladká, později drsná, zelená, šedá, hnědá až černá. Listy jsou tmavězelené, zpeřené, řapíky dlouhé 0,7 - 2cm, tvoří je 5 - 26 primárních párů, 15 - 72 sekundárních, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 5mm, široké 0,4 - 0,7mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je hrozen nebo lata, hlávky jsou 15 - 50tičetné a vlastní květy béžové nebo světležluté. Plodem je kožovitý černý lusk délky 2 - 12cm a šířky 0,5 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *irrorata*/A. *decurrens* f. *paucoglandulosa* - strom; výška do 12m; borka tmavěšedá, tmavěhnědá až černá; listy mají řapíky i vřeteno ochlupené; lusky jsou v mládí ochlupené
- subsp. *velutinella* - Nový Jižní Wales; větve v mládí ochlupené a žluto oranžové; borka hladká, zelená až černá, šedě pruhovaná; listy mají řapíky i vřeteno žláznaté; lusk je řídce dlouze ochlupený

<https://www.rostliny.net/>