

Acacia cochlocarpa

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Větve mohou být v mládí ochlupené. Fylodia jsou vzpřímená, eliptická, zahnutá, špičatá až tupá, kožovitá, dlouhá 2,5 - 7,5cm a široká 3 - 6mm. Květenství je párovité, hlávky jsou přisedlé, kulovité až krátce válcovité, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 5 - 6mm, vlastní květy žluté, 4četné a kališní lístky z 1/2 srostlé. Plodem je lusk, může být sametový a obsahuje semena délky 1,5 - 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cochlocarpa* - fylodia ostrá, dlouhá 3 - 7,5cm, široká 4 - 6mm; hlávky krátce válcovité, dlouhé 0,7 - 1cm, listence tupé, obvejčité, dlouhé 0,8mm; plody holé
- subsp. *velutinosá* - větve v mládí ochlupené; fylodia zpravidla tupá, dlouhá 2,5 - 4cm a široká 3 - 5mm; hlávky kulovité, dlouhé 5 - 7mm, listence vejčité, špičaté, dlouhé 1,2 - 1,8mm; plody sametové

<https://www.rostliny.net/>