

Acacia lasiocarpa

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1,5m. Větve jsou nestejněměrně ochlupené. Listy jsou zpeřené, mají 0,5mm řapík, tvoří je 1 primární pár, 2 - 8 sekundárních párů, vlastní lístky jsou zelené, dlouhé 1 - 5mm a široké 0,5 - 1mm. Květenstvím je samostatná nebo párovitá kulovitá 16 - 50tičetná hlávka na 0,2 - 1,2cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, žluté a kališní lístky jsou částečně srostlé. Plodem je lusk délky 1 - 4cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje eliptická až kulovitá semena délky 1,5 - 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bracteolata* - keř; výška 20 - 60cm; větve v mládí ochlupené; listy tvoří primární díly o délce 1 - 3mm, 2 - 3 sekundární páry délky 2 - 5mm; hlávky 17 - 27tičetné, v průměru mají 5 - 7mm a mají 3 - 6mm stopku; lusky holé, semena šedobílá
- var. *lasiocarpa* - keř; výška 0,3 - 1,5m; listy tvoří primární díly o délce 0,3 - 1cm, 4 - 8 sekundární páry délky 2 - 3mm; hlávky 25 - 50tičetné, v průměru mají 5 - 7mm a mají 5 - 7mm stopku; lusky zploštělé a mohou být jemně ochlupené, semena šedohnědá
- var. *sedifolia*/A. *cycnorum*/A. *cycnorum* var. *minutifolia*/A. *cycnorum* var. *sedifolia*/A. *pulchella* var. *cycnorum* - keř; výška 0,2 - 1m; větve v mládí jemně ochlupené; listy mají primární páry délky 1 - 2mm, 2 - 3 sekundární páry délky 1 - 2mm; hlávky zpravidla kulovité, 16 - 23četné, v průměru mají 3 - 5mm a mají 2 - 4mm stopku; plodem je jemně ochlupený lusk, semena hnědá

<https://www.rostliny.net/>