

Acacia fauntleroyi

synonyma: *Acacia oncinophylla* var. *fauntleroyi*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Etiopie, Keňa, Somálsko, Súdán, Uganda, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Fylodia jsou čárkovitá, mohou být mírně zahnutá, stříbřitě- až šedozelená, ochlupená, dlouhá 8 - 20cm a široká 1,5 - 4mm. Květenství je samostatné či párovité, má 0,4 - 1cm stopku, hlávky jsou eliptické až válcovité, 43 - 50tičetné, dlouhé 0,7 - 1,5cm, široké 5 - 7mm, vlastní květy žluté, 5tičetné a kališní i korunní lístky z 1/2 - 3/4 srostlé. Plodem je čárkovitý kožovitý lusk délky do 10cm, šířky 5mm, může být mírně zahnutý a obsahuje eliptická semena délky 3,5 - 4mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *benadirensis*/A. *benadirensis*/A. *bussei* var. *benadirensis*/A. *latronum* subsp. *benadirensis* - Etiopie, Somálsko, Keňa, Uganda, Súdán; zpravidla vícekmenný keř nebo strom; výška 0,5 - 2,5cm; trny párovité na kolénkách, dlouhé 0,5 - 9cm; listy zpeřené, 2 - 6 primárních párů, 5 - 11 sekundárních párů, vlastní lístky dlouhé 2 - 6mm, široké 0,7 - 1,8mm; květenstvím je klas délky 1 - 4,5cm, vlastní květy bílé až béžové, kalich dlouhý 0,8 - 1mm, koruna dlouhá 2mm; lusky hnědočervené, srpovité, zpravidla ochlupené, dlouhé 2,3 - 6cm, široké 1,5 - 2,5cm

<https://www.rostliny.net/>