

# Acacia lanigera

synonyma: *A. var. brachyphylla*, *Racosperma lanigerum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí na koncích hranaté. Fylodia jsou eliptická až úzce obkopynatá, mohou být mírně zahnutá, špičatá nebo ostrá, dlouhá 2 - 6,5cm, široká 0,4 - 1cm. Květenstvím je prakticky kulovitá 20 - 30tičetná hlávka o průměru 4,5 - 6,5mm na 2 - 9mm stopce, vyrůstá po 1 - 4ks, listence jsou obvejčité, kopinaté nebo eliptické, prakticky přisedlé, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a z větší části srostlé. Plodem je čárkovitý kožovitý lusk délky do 10cm, šířky 4 - 6mm a obsahuje eliptická semena délky 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *gracilipes* - Viktorie, Nový Jižní Wales; větve v mládí ochlupené; fylodia eliptická, ostrá, dlouhá 3,5 - 4cm, široká 3 - 6mm; květenství má 6 - 9mm stopku, hlávky kulovité o průměru 5mm
- var. *lanigera* - Viktorie, Nový Jižní Wales; větve v mládí ochlupené; fylodia úzce eliptická až úzce obvejčítá, ostrá, dlouhá 3 - 6cm, široká 3 - 8mm; květenství má 2 - 4mm stopku, hlávky kulovité až téměř kulovité a v průměru mají 6,5mm
- var. *whanii* - Viktorie; větve řídce ochlupené; fylodia úzce eliptická až úzce obkopynatá, tupá až zašpičatělé, dlouhá 4 - 5,5cm, široká 6 - 7mm; květenství má stopku délky 2 - 4mm, hlávky prakticky kulovité, dlouhé 5mm

<https://www.rostliny.net/>