

# Acacia leptospermoides

synonyma: *Acacia ericifolia* var. *crassa*, *Acacia ericifolia* var. *glaucescens*, *Acacia ericifolia* var. *tenuis*, *Acacia spathulata*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Větve mohou být v mládí krátce ochlupené. Fylodia jsou čárkovitá až obvejčitá nebo kulovitá, tupá, tlustá, dlouhá 0,3 - 1,7cm a široká 1 - 7mm. Květenstvím je samostatná nebo párovitá kulovitá 20 - 35tičetná hlávka o průměru 4 - 5mm na 0,4 - 1,2cm stopce, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky mohou být z 1/2 srostlé. Plodem je čárkovitý až stočený lusk délky do 3cm, šířky 1,5 - 2mm a obsahuje eliptická semena délky 2,5 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *leptospermoides* - výška 0,4 - 2 (i 3); větve v mládí ochlupené; fylodia čárkovitá až obkopynatá, dlouhá 0,7 - 1,7cm, široká 1 - 6mm; lusky zahnuté až otevřeně stočené
- subsp. *obovata* - výška 0,4 - 1,3m; větve v mládí ochlupené; fylodia obvejčitá až kulatá, dlouhá 0,5 - 1cm, široká 4 - 7mm; lusky zahnuté
- subsp. *psammophila*/A. *psammophila* - rozkladitý keř; výška 0,3 - 1,2m; větve mohou být v mládí ochlupené; fylodia obvejčitá až obkopynatá, dlouhá 3 - 7mm, široká 1 - 2mm; lusky zahnuté až otevřeně stočené

<https://www.rostliny.net/>