

Acacia leucoclada

synonyma: *Racosperma leucocladum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře nebo rozkladitého stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 20m. Borka je ve spodních částech drsná, šedá, hnědá až černá, v ostatních částech hladká a šedá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zelené až stříbřité, zpeřené, mají 0,5 - 3cm řapík, tvoří je 5 - 18 primárních párů, 11 - 45 sekundárních, vlastní lístky jsou ochlupené, dlouhé 1 - 6mm a široké 0,4 - 1mm. Květenstvím je hrozen nebo nepravá lata, hlávky jsou 20 - 26tičetné a vlastní lístky jsou žluté. Plodem je prakticky kožovitý hnědočervený až hnědošedý lusk délky 3 - 12cm a šířky 0,4 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *argentifolia*/*Racosperma leucocladum* subsp. *argentifolium* - strom; výška do 20m; větve ochlupené; lístky široké 0,4 - 0,9mm
- subsp. *leucoclada*/*Racosperma leucocladum* subsp. *leucocladum* - strom (i keř); výška do 10 (i 13)m; větve v mládí mohou být ochlupené; lístky široké 0,5 - 1mm

<https://www.rostliny.net/>