

# Acacia longispicata

synonyma: *Acacia cunninghamii* var. *longispicata*, *Racosperma longispicata*, *Racosperma longispicatum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Borka je na bázi drsná, vláknitá a tmavěšedá. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Fylodia jsou eliptická, zploštělá, zahnutá, kožovitá, zpravidla stříbřitá, dlouhá 10 - 19cm a široká 1,4 - 4,4cm. Květenstvím je klas délky 3,5 - 12cm, vlastní květy jsou 5tičetné, žluté, kalich dlouhý 0,5 - 0,8mm a koruna je dlouhá 1,5 - 1,8mm. Plodem je zkroucený lusk délky 3 - 11,8cm a obsahuje tmavěhnědá semena délky 2,5 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *longispicata*/*Racosperma longispicatum* subsp. *longispicatum* - větve v mládí ochlupené; fylodia ochlupená; klas dlouhý 6 - 12cm, stopky alespoň trochu ochlupené
- subsp. *velutina*/*Racosperma longispicatum* subsp. *velutinum* - větve v mládí ochlupené; fylodia zpravidla holá; klas dlouhý 5 - 9cm

<https://www.rostliny.net/>