

# Acacia moirii

synonyma: *Acacia moirrii* subsp. *moirrii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Listy mají řapík délku 1 - 2mm, jsou zpeřené, tvořené 1 primárním párem, 3 - 7mi sekundárními páry, vlastní lístky jsou zelené až namodralé, dlouhé 0,2 - 1cm a široké 1 - 3mm. Květenstvím je kulovitá 15 - 25tičetná hlávka na 0,5 - 2cm stopce, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné. Plodem je lusk délky do 4cm, šířky 5 - 6mm a obsahuje eliptická nebo kulovitá semena délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *dasycarpa* - větve v mládí ochlupené; palisty jsou dlouhé 4 - 8mm; primární páry listů dlouhé 0,6 - 1,5cm, sekundárních párů je 3 - 4ks a jsou hustě krátce ochlupené; květenství mívá stopku délky 1,5 - 2cm
- subsp. *moirii* - větve v mládí ochlupené; palisty dlouhé 2 - 4mm; primární páry listů dlouhé 0,7 - 1cm, sekundárních párů je 3 - 7ks, lístky jsou na okraji zpravidla řídce ochlupené, na spodní straně obvykle ochlupené; hlávky mají 0,8 - 1,3cm dlouhou stopku
- subsp. *recurvistipula* - větve v mládí zpravidla ochlupené; palisty jsou dlouhé 5 - 8mm; primární páry listů jsou dlouhé 5 - 8mm, sekundárních párů je 3 - 5ks, vlastní lístky mohou být na okraji ochlupené, občas i na spodní straně; květenství má 0,5 - 1,5cm dlouhou stopku

<https://www.rostliny.net/>