

Acacia pachyphloia

čeleď: Fabaceae

oblasti: Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu s převislými větvemi. Dorůstá výšky 2 - 14m. Borka je korkovitá a brázditá. Listy jsou zpeřené, mají řapík délky 1,2 - 7,5cm, čepel tvoří 1 - 11 primárních párů, 8 - 54 sekundárních párů, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité či obkopinaté, dlouhé 0,3 - 3,5cm a široké 0,2 - 1cm. Květenství vyrůstá v 1 - 4četných svazečcích až hroznech na 0,8 - 5,5cm stopce, hlávky jsou kulovité, 19 - 34četné, vlastní květy jsou světležluté, béžové nebo bílé. Plodem je kožovitý až dřevnatý lusk délky 4 - 18,3cm a šířky 0,8 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brevipinnula* - větve jsou v mládí ochlupené; listy mají 1 - 11 primárních párů, max. 54 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 1cm a široké 1,5 - 2,5mm; lusky jsou krátce ochlupené
- subsp. *pachyphloia* - větve v mládí max. řídce ochlupené; listy mají 1 - 5 primárních párů, max. 31 sekundárních, vlastní lístky jsou dlouhé 0,7 - 3,5cm a široké 0,2 - 1cm; lusky holé nebo řídce ochlupené

<https://www.rostliny.net/>