

Acacia pennata

synonyma: *Acacia canescens*, *Acacia hainanensis*, *Acacia pendata*, *A. var. canescens*, *A. var. heyneana*, *Albizia tenerrima*, *Mimosa ferruginea*, *Mimosa pennata*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Bhútán, Jáva, Kambodža, Laos, Malé Sundry, Myanmar (Barma), Queensland, Sikkim, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Vietnam

Roste v Bhútánu a Indii v podobě popínavé rostliny nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 8m. Větve jsou řídce ostnité. Listy jsou zpeřené, dlouhé 15 - 20cm, tvoří je 12 - 26 primárních párů, 60 - 70 sekundárních párů, vlastní lístky jsou čárkovité, tupé až špičaté, asymetrické, dlouhé 3 - 7mm, široké 0,7 - 1,5mm a báze je uťatá. Květenstvím je lata, hlávky jsou kulovité o průměru 1cm, vlastní květy mají kalich délky 2 - 2,5mm a korunní lístky jsou žluté a dlouhé 2,5 - 3mm. Plodem je kožovitý lusk délky 10 - 16cm, šířky 2,5 - 3,5cm a obsahuje 6 - 12 semen délky 1,2 - 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *kerrii*/*A. tomentella*/*A. tomentella* f. *minor* - Austrálie, Indie, jihovýchodní Asie; liána; řídce ostnitá, ostny dlouhé 0,5 - 4mm; konce větví bleděhnědé, plstnaté; palisty kopinaté; listy mají 1,5 - 4cm řapík, čepel tvoří 1 - 5 primárních párů, 9 - 92 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 7mm, široké 0,3 - 1,5mm; květenstvím je hrozen nebo lata, vlastní květy prakticky přisedlé, žlutobílé až béžové, 5tičetné, kalich dlouhý 1,5 - 2mm, cípy dlouhé 0,5mm, koruna dlouhá 2,1 - 2,8mm; plodem je bleděhnědý až hnědočervený lusk délky 6,5 - 15,5cm, šířky 1,3 - 2,4cm a obsahuje černá eliptická semena délky 7mm a šířky 5mm

<https://www.rostliny.net/>