

Acacia reficiens

čeleď: Fabaceae

oblasti: Etiopie, Keňa, Somálsko, Súdán, Uganda

Roste ve východní Africe v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 6m. Borka je šedá, hnědá nebo černá, drsná, rozpukaná. Větve jsou v mládí šedé až hnědé, krátce ochlupené. Palisty jsou přeměněné v až 6cm dlouhé šedé trny s háky. Listy jsou zpeřené, mají 1cm řapík, čepel tvoří 1 - 4 primárních páry, 5 - 11 sekundárních párů, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 6mm a široké 0,5 - 1,3mm. Květenstvím je hlávka a vlastní květy jsou bílé. Plodem je hnědý nebo tmavě růžovofialový lusk délky 2,5 - 8,8cm, šířky 0,6 - 1,5cm, může být ochlupený a obsahuje zpravidla eliptická zploštělá semena délky 5 - 8mm a šířky 4 - 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *misera*/A. *misera*/A. *stefaninii* - Somálsko, Etiopie, Súdán, Uganda, Keňa; hlávka má 0,4 - 1,3cm dlouhé stopky; plody jsou široké 0,6 - 1cm

<https://www.rostliny.net/>