

Acacia schweinfurthii

čeleď: Fabaceae

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře, stromu s rozkladitou korunou anebo šplhavé dřeviny. Borka je hladká. Na kmíncích vyrůstají řídké hákovité ostny. Listy mají řapíky délky 2,5 - 6,5cm, jsou zpeřené, tvořené 9 - 17ti primárními páry, 17 - 60ti sekundárními páry, vlastní lístky jsou zelené, široké 1 - 2mm a přisedlé. Kvete bílými nebo světleběžovými květy. Plodem je kožovitý lusk délky 10 - 19cm a šířky 1 - 3cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *schweinfurthii* - popínavá dřevina nebo keř; výška 10 - 15m; borka hladká, světlehnědá; větve v mládí béžové, křehké s hákovitými trny; listy 2x zpeřené, dlouhé do 20cm, čepel tvoří 6 - 17 primárních párů, 15 - 53 sekundárních párů, vlastní lístky jsou tmavězelené, dlouhé do 8mm a široké 1mm; květenstvím je svazeček, hlávky mají v průměru do 1,2cm; lusky jsou zploštělé, kožovité, světlehnědé, dlouhé 15 - 19cm a široké 2 - 3cm

<https://www.rostliny.net/>