

Acacia wickhamii

synonyma: *Racosperma wickhamii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Borka je zpravidla šedá. Fylodia jsou kopinatá, vejčitá až eliptická, mohou být zahnutá, kožovitá, dlouhá 4 - 3cm a široká 0,2 - 1cm. Květenstvím je hlávka délky 0,5 - 3,5cm, vlastní květy jsou 5tičetné, žluté až žlutooranžové, kalich je dlouhý 0,6 - 1mm a koruna je dlouhá 1 - 1,7mm. Plodem je obkopinatý, eliptický nebo čárkovitý lusk délky 2 - 9cm, šířky 0,3 - 1cm a obsahuje eliptická hnědá až tmavěhnědá semena délky 2,5 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cassitera*/A. *nuperrima* subsp. *cassitera*/*Racosperma nuperrimum* subsp. *cassiterum* - Queensland; výška 0,2 - 1m; fylodia svírají ostrý úhel, mírně kopinatá, zploštělá, dlouhá 1 - 2,3cm, široká 1,5 - 5mm; hlávka dlouhá 0,5 - 1,4cm (i kulovitá průměru 3mm); lusky dlouhé do 4,1cm a široké 3,5 - 7mm
- subsp. *parviphylloidea*/A. *calligera* - severní Austrálie, Queensland; výška 0,4 - 1,5m; fylodia svírají pravý úhel, eliptická až vejčitá, zelená až namodralá, dlouhá 0,4 - 1,6cm, široká 2 - 9mm; lusky dlouhé do 5,5cm a široké 3 - 8mm
- subsp. *viscidula*/var. *viscidula* - Západní a severní Austrálie; výška 0,3 - 2,5m; fylodia eliptická nebo vejčitá, dlouhá 0,7 - 2,3cm, široká 0,35 - 1cm; hlávky klasnaté, dlouhé 1,5 - 3,5cm; lusky dlouhé do 6 (i 9)cm a široké 5 - 8mm
- subsp. *wickhamii* - Západní a severní Austrálie; výška 0,25 - 1,6m; fylodia svírají zpravidla pravý úhel, eliptická až kopinatá (i vejčitá), zelená, dlouhá 0,8 - 3cm a široká 0,3 - 1cm; hlávka zpravidla klasnaté, dlouhé 0,8 - 3,5cm; lusky dlouhé do 6,5cm a široké 1cm

<https://www.rostliny.net/>